

DENTRE OS DIVERSOS EXAMES DA GESTANTE NO PRÉ-NATAL E PARTO... SÍFILIS

Exame	Início do PN (1º trimestre)	2º trimestre (se possível)	3º trimestre (28ª a 30ª semana)	Parto (nascido vivo ou natimorto)
<p>Sorologia para Sífilis:</p> <p>VDRL/RPR e FTA-Abs, EIA ou TPHA</p> <p>(na mesma amostra para confirmação de infecção)</p>	<p>Se (+):</p> <ul style="list-style-type: none"> Tratar gestante Notificar a Vigilância Epidemiológica Seguimento sorológico 	<p>Se (+):</p> <ul style="list-style-type: none"> Tratar gestante Notificar a Vigilância Epidemiológica Seguimento sorológico 	<p>Se (+):</p> <ul style="list-style-type: none"> Tratar gestante Notificar a Vigilância Epidemiológica Seguimento sorológico 	<p>Se (+):</p> <ul style="list-style-type: none"> VDRL no sangue periférico do recém nascido vivo Tratar mãe e recém nascido Notificar o natimorto ou recém nascido vivo com sífilis congênita
<p>Se iniciar com Teste Rápido (TR)</p>	<p>Se (+):</p> <ul style="list-style-type: none"> Tratar gestante Realizar VDRL/RPR Notificar a Vigilância Epidemiológica Seguimento sorológico 	<p>Se (+):</p> <ul style="list-style-type: none"> Tratar gestante Realizar VDRL/RPR Notificar a Vigilância Epidemiológica Seguimento sorológico 	<p>Se (+):</p> <ul style="list-style-type: none"> Tratar gestante Realizar VDRL/RPR Notificar a Vigilância Epidemiológica Seguimento sorológico 	<ul style="list-style-type: none"> Notificar a mãe como sífilis adquirida Seguimento sorológico da mãe e do recém nascido